

/Salut


Roda de premsa | 25.10.2021

Campanya de vacunació antigripal 2021-2022

- Malaltia infecciosa vírica, molt contagiosa.
- La incidència de la grip durant les epidèmies oscil·la entre el 5% i el 15% en la població general, i arriba al 50% o més en les persones internades en institucions tancades.
- La mortalitat es produeix principalment en persones grans o amb factors de risc preexistents.
- L'any 2019 s'estima que amb la vacunació s'han evitat un 37% de morts, un 40% d'ingressos en UCI i un 26 % d'hospitalitzacions atribuïbles a la grip en majors de 64 anys a Espanya (MS) .
- A Catalunya, com a la resta de l'hemisferi nord, la infecció pels virus de la grip habitualment es presenta en forma d'epidèmia anual durant els mesos d'hivern (des de finals de desembre a març).

Spain

Number of specimens positive for influenza by subtype



Data source: FluNet (www.who.int/fluinet/), GISRS

© World Health Organization 2021

Circulació de virus de la grip



Southern hemisphere

Influenza Laboratory Surveillance Information


by the Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS)

generated on 25/10/2021 04:31:43 UTC

[Click here for any week\(s\) chart](#)

Southern hemisphere

Number of specimens positive for influenza by subtype



Data source: FluNet (www.who.int/fluNet), GISRS

© World Health Organization 2021

Northern hemisphere

Influenza Laboratory Surveillance Information


by the Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS)

generated on 25/10/2021 04:27:47 UTC

[Click here for any week\(s\) chart](#)

Northern hemisphere

Number of specimens positive for influenza by subtype



Data source: FluNet (www.who.int/fluNet), GISRS

© World Health Organization 2021

Spain

Number of specimens positive for influenza by subtype




Data source: FluNet (www.who.int/flu-net), GISRS

© World Health Organization 2021

Grup	Cobertura (%)
65 anys o més*	62,3
14-59 anys*	26,2
0-14 anys*	45,7
Dones embarassades**	41,7
Personal sanitari***	42,5

Evolució de la vacunació de la grip 2016-2021 en dones embarassades a Catalunya




*Dades facilitades pel SEGRIP

** Dades facilitades pel SISAP

***Dades facilitades per la Societat Catalana de Salut Laboral

Evolució de la vacunació de la grip 2012-21 dels treballadors sanitaris a Catalunya, Registre SCSL



Influenza

during the COVID-19 pandemic

Why is it important to get vaccinated against influenza during the COVID-19 pandemic?

- By getting vaccinated, you help protect the vulnerable, such as the elderly and those with chronic underlying medical conditions. These are people who are at increased risk of severe outcomes such as respiratory difficulties or death.
- Both influenza and COVID-19 can cause severe disease, but note that the influenza vaccine only protects against influenza.
- Dual infection with COVID-19 and influenza is likely to cause more severe outcomes.
- Both COVID-19 and influenza can disrupt healthcare services and the functioning of nursing homes. It is especially important this year that healthcare staff get vaccinated against influenza and that healthcare services keep running.



- La vacuna contra la grip redueix:
 - les hospitalitzacions
 - la mortalitat a les persones amb risc de malaltia greu
 - la càrrega assistencial sobre el sistema de salut
- Els grups de risc son molt similars: En el context de la pandèmia de la COVID-19 encara, és més important augmentar les cobertures de vacunació contra la grip en grups prioritaris.
- La simptomatologia és molt similar en molts casos; evitar casos de grip evita tenir que fer el diagnòstic diferencial amb la COVID
- No hi ha un major risc d'infectar-se pel coronavirus SARS-CoV-2 o de patir la COVID-19 de major gravetat per haver rebut una vacuna contra la grip. De fet, diversos estudis apunten que la vacunació contra la grip podria associar-se amb menor gravetat i menor mortalitat per la COVID-19.
- Hi ha algunes evidències de que ambdós virus competeixen, però en els casos en que ambdós coincideixen la probabilitat de morir és el doble que si només es pateix la COVID-19 i 6 vegades més que si no es té cap dels 2 virus (Stowe,2021).

Grups de risc a vacunar contra la grip

- ☐ **Persones amb alt risc de complicacions**
 - ☐ Persones de 60 anys i més
 - ☐ Pacients amb problemes de salut crònics i factors de risc (hipertensió)
 - ☐ Dones embarassades i puerperi fins 6 mesos
 - ☐ Infants entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat (<32 set)
 - ☐ Persones amb immunosupressió
- ☐ **Persones que poden transmetre la grip a persones d'alt risc**
 - ☐ Treballadors sanitaris i sociosanitaris
 - ☐ Contactes i cuidadors de persones d'alt risc
- ☐ **Persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat**
 - ☐ Policies, bombers, personal de protecció civil, etc.
 - ☐ Docents

Vacunar les persones en què la grip pot produir les complicacions més greus i causar més mortalitat

- Millorar la cobertura de vacunació en les persones de més de 60 anys (apropant-se al 75%)
- Millorar la cobertura de en les persones amb **problemes de salut crònics i condicions de risc** (objectiu apropar-se al 60%)
- Fer un salt qualitatiu en la cobertura de la vacunació dels professionals sanitaris (objectiu apropar-se al 75%)
- Incrementar la cobertura de vacunació **en dones embarassades.** (objectiu apropar-se al 60%)

Vacunes disponibles per a la campanya 2021-2022

1.570.000*

- 70.000 Vacunes tetravalents d'alta càrrega antigènica (Efluelda)
- 650.000 Vacunes tetravalents d'immunogenicitat reforçada per a les persones de 65 o més anys (Fluad)
- 850.000 Vacunes tetravalents (Vaxigrip i Influvac)

Per a aquesta campanya, totes les vacunes utilitzades a Catalunya són vacunes tetravalents.

** S'han comprat 120.000 més que al 2020-2021*

Les produïdes a partir **d'ous embrionats** i les vacunes vives atenuades:

- soca anàloga a A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
- soca anàloga a A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)
- soca anàloga a B/Washington/02/2019 (llinatge B/Victoria)

Les produïdes a partir de **cultius cel·lulars**:

- soca anàloga a A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09
- soca anàloga a A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)
- soca anàloga a B/Washington/02/2019 (llinatge B/Victoria)

Les vacunes tetravalents porten a més de les soques incloses a la trivalent, una soca anàloga a: B/Phuket/3073/2013 (llinatge B/Yamagata/16/88)

Soques diferents a les de l'any passat

Recomanacions de vacunació contra la grip

Campanya 2021-2022

30 d'agost 2021

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/



Recomendaciones vacunación gripe
Temporada 2021-2022

RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE Temporada 2021-2022

La vacunación antigripal tiene como objetivo reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad. Por ello, deberá ir dirigida fundamentalmente a proteger a las personas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de padecer la gripe o a las que pueden experimentar la enfermedad a nivel que tienen un alto riesgo de complicaciones, tal y como se refleja en el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida y en el calendario de vacunación de grupos de riesgo¹. Además, se recomienda vacunar a las personas que, por su ocupación, proporciones servicios esenciales en la comunidad y a personas con exposición laboral a virus aviares o porcinos.

Para esta campaña, y debido al efecto sinérgico observable entre el virus de la gripe y el SARS-CoV-2, multiplicando por dos el riesgo de muerte en caso de coinfección², se realiza un esfuerzo especial en aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe especialmente en el personal sanitario y sociosanitario, personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años y personas de cualquier edad con condiciones de riesgo. El objetivo es proteger a las personas más vulnerables a la gripe, disminuyendo la máxima posible la incidencia de gripe en estos grupos diana y contribuyendo a reducir el impacto sobre la presión asistencial.

A - COMPOSICIÓN DE LA VACUNA PARA LA TEMPORADA 2021-2022

En el mes de febrero de cada año, la OMS publica la composición de la vacuna para su utilización en el hemisferio norte³.

Las vacunas **trivalentes** recomendadas para esta temporada 2021-2022 deberán contener las siguientes componentes⁴:

Las producidas a partir de huevos embrionados y las vacunas vivas atenuadas;

- cepa análoga a A/Victoria/2019/2019 (H1N1)pdm09
- cepa análoga a A/Cambodia/05/2005 (H3N2)
- cepa análoga a B/Washington/02/2019 (Infl B/Victoria)

¹ Calendario de vacunación a lo largo de toda la vida. Calendario de vacunación en grupos de riesgo en población infantil y en población adulta. Disponible en: <https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-referencias.htm#inicio>

² Cori JJ. Risk of death more than doubled in people who also had flu. English data show. BMJ 2020;370:m3720. <https://doi.org/10.1136/bmj.m3720>

³ Jones S, Treister R, Zhai H et al. Interactions between SARS-CoV-2 and influenza and the impact of coinfection on illness severity: A risk register design. medRxiv 2020:09.18.20199497. doi: <https://doi.org/10.1101/2020.09.18.20199497>

⁴ WHO. Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2021-2022 northern hemisphere influenza season. 26 February 2021. Disponible en: https://www.who.int/influenza/vaccines/vaccine/composition/2021-22_north/

⁵ European Medicines Agency. EU recommendations for the seasonal influenza vaccine composition for the season 2021/2022. EMA/PR/2021. Disponible en: <https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-recommendations-2021-2022-seasonal-flu-vaccine-composition>

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Recomendaciones_vacunacion_gripe.pdf

Campanya de vacunació

- Compra i distribució de les vacunes
- Inici de la campanya: 25 d'octubre 
- Publicació del document *Recomanacions de vacunació contra la grip*
- S'han habilitat centres de vacunació complementaris als centres d'atenció primària
- Informació a la població sobre la campanya i els llocs de vacunació
- Seguiment de la vacunació: cobertura vacunal, vigilància epidemiològica i avaluació

Conjuntament amb vacunació contra la COVID-19 en 70 i +

Vacunació contra la COVID-19 en persones de 70 anys i més

- ❑ Les persones grans responen a la vacunació contra la COVID-19
- ❑ Presenten més risc de complicacions a COVID-19
- ❑ Pèrdua d'efectivitat amb el temps (aprox. 6 mesos)
- ❑ Presencia d'immunosenesescència



Dosi de Record

Vacunació contra la COVID-19 en persones de 70 anys i més

- ☐ Inici de la vacunació el 25/10/2021
- ☐ Conjuntament amb la campanya grip estacional
- ☐ Vacuna ARNm
- ☐ 6 mesos després de la segona dosi
- ☐ Co-administració amb d'altres vacunes: grip, pneumococ
- ☐ La tolerància de les 3^{es} dosis és similar a les 2^{es}, excepte amb un major grau de linfadenopaties axil·lars.



Actualización 9

Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España

Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones

28 de octubre de 2021

Este documento técnico está dirigido a gestores del programa de vacunación y personal sanitario y está sujeto a revisión y actualización continua en función de las nuevas evidencias, la disponibilidad de vacunas y la situación epidemiológica.

3.4 Recomendaciones

3.4.1. Población general. Se administrará una dosis de recuerdo con vacunas de ARNm a las personas de 70 y más años de edad. Esta dosis de recuerdo se administrará a partir de los 6 meses de haber completado la pauta de vacunación.

Desde la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y el Grupo de Trabajo Técnico se continuarán valorando los resultados de los estudios de la efectividad de la vacunación realizados con datos de España para hacer propuestas de recomendaciones de administración de dosis de recuerdo en otros grupos de población.

Grupo de trabajo técnico de vacunación COVID-19 y Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones

18/10/2021

Dosis adicionales

Situació de base: 1 o 2 dosis per població de 12 o més anys



Pauta inicial amb 3 dosis per a grups determinats (immunosupressió, grup 7 molt alt risc)



Pauta inicial amb 2 dosis i una de record separada almenys 6 mesos (residències i 70 anys o més)



- 3.4.3. **Personas internas en centros residenciales de mayores.** Se administrará una dosis de recuerdo (pudiendo vacunar junto con gripe⁹³ o adelantarse a ella, en función de la situación epidemiológica y la factibilidad). Para la dosis de recuerdo se utilizará vacuna de ARNm (Comirnaty o Spikevax), preferentemente la misma vacuna que la administrada con anterioridad, a partir de los 6 meses de haber administrado la segunda dosis de primovacuna. Si alguna persona se ha vacunado con Janssen o Vaxzevria, se administrará como dosis de recuerdo una vacuna de ARNm.

Las personas con antecedente de infección sintomática o asintomática por SARS-CoV-2, independientemente de la fecha de confirmación, se vacunarán como se especifica a continuación:



Aplicable a
70 i més

Momento de la infección	Intervalo para administración de dosis recuerdo*
Antes de la primera dosis	A partir de los 6 meses tras la segunda dosis
Entre la primera y segunda dosis	A partir de los 6 meses tras la segunda dosis
Después de la segunda dosis	A partir de los 6 meses tras la segunda dosis, cuando estén completamente recuperadas y haya finalizado el período de aislamiento

- 3.4.4. **Coadministración de vacunas.** Las vacunas de ARNm frente a COVID-19 se pueden administrar de manera concomitante con cualquier vacuna, en lugares anatómicos diferentes^{94,95}, incluida la vacuna frente a gripe⁹³ y neumococo.

Inici > Salut > G > Grip > Vacunació

Vacunació de la grip



En algunes persones la grip pot arribar produir complicacions greus. Alhora, l'evidència recent mostra que la mortalitat de les persones amb COVID-19 es duplica quan també estan infectades pel virus de la grip. Vacunar-se contra la grip és vital per reduir la transmissió de la malaltia i facilitar, alhora, la lluita contra la COVID-19.

La vacuna, que s'ha d'administrar cada any perquè la seva preparació varia en funció dels virus gripals, és segura i té uns efectes adversos mínims. Les persones considerades de risc es poden vacunar gratuïtament al sistema sanitari públic.

Demaneu cita per vacunar-vos

↓ citasalut.gencat.cat

↓ [La Meva Salut](#)

▼ Qui s'ha de vacunar?

▼ Quan i com em puc vacunar?

🗑 Influenza-characte...pdf ⬆ 🗑 Influenza-characte...pdf ⬆ 🗑 Informe.semanal.S...pdf ⬆

Mostra-ho tot ✕

<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/vacunacio/>

AQUEST HIVERN NO T'ARRISQUIS, **VACUNA'T ARA** **CONTRA LA GRIP**

**Campanya de vacunació
contra la grip 2021**



Si tens 60 anys o més, si pateixes
una malaltia crònica, si estàs embarassada
o si ets professional de la salut.

Lloc de vacunació

Data / Hora

AQUEST HIVERN NO T'ARRISQUIS, **VACUNA'T ARA** **CONTRA LA GRIP**



Si tens 60 anys o més,
si estàs embarassada o
si tens alguna malaltia crònica.

Demana cita

a través del web **citasalut.gencat.cat**
o de La Meva Salut a l'apartat Cita.

Recomanacions per a dur a terme la vacunació

- Espais diferenciats en els centres de salut
- Espais alternatius on es garanteixin les mesures per a una correcta vacunació:
 - Neteja, desinfecció i ventilació
 - Distàncies
 - Gel hidroalcohòlic
 - Circuit diferenciati d'entrada i sortida.



**AQUEST HIVERN
NO T'ARRISQUIS,
VACUNA'T ARA
CONTRA LA GRIP**

**Punt de vacunació segur.
Ajuda'ns a mantenir-lo net.**



Renta't les
mans amb
freqüència



Ventila
els espais
tancats



Posa't
la mascareta
cobrint el nas
i la boca



Beu
aigua
sovint



Utilitza
mocadors d'un
sol ús quan tossis
o estornudes

Demana cita
a través del web **citasalut.gencat.cat**
o de La Meva Salut a l'apartat Cita.

Recomanacions per a dur a terme la vacunació

- Oferir la vacunació a totes les persones incloses als grups de risc i aprofitar la vacunació oportunista (acompanyants o convivents)
- Les persones de 70 anys i més poden rebre la vacuna contra la COVID-19 el mateix dia que l'antigripal si fa 6 mesos que van rebre la 2a dosi.

En resum

- ❑ La grip és un important problema de salut pública, tant per la seva freqüència com per la possibilitat de presentar complicacions.
- ❑ La prevenció mitjançant la vacunació és la principal mesura per evitar l'aparició de la malaltia.
- ❑ Catalunya fa un important esforç comprant, distribuint i administrant al voltant 1,6 milions de dosis de vacunes.
- ❑ Les persones amb les condicions de risc poden vacunar-se a partir de 25 d'octubre demanant cita al centre de salut.
- ❑ Durant la pandèmia de COVID-19 encara és més important vacunar-se enfront la grip, la mateix temps que aplicar la resta de mesures de protecció i prevenció (Distància|Mans|Mascareta, etc)

/Salut