

## **Nota informativa sobre la normalització de l'ús de la vacuna contra l'hepatitis A en adults (HA)**

La disponibilitat de la vacuna contra l'HA en els centres vacunals es normalitzarà de manera progressiva a partir del 19 de juny. S'han dut a terme les gestions necessàries per poder disposar de vacunes i, així, poder restablir les indicacions de vacunació a Catalunya.

Tanmateix, encara no es pot disposar de totes les dosis necessàries per seguir les pautes habituals de vacunació i cal continuar mantenint la restricció d'utilització d'una única dosi (excepte en el cas de les persones amb immunodepressió). Com s'ha recollit en notes anteriors, l'efectivitat d'una única dosi de vacuna és molt alta, superior al 97%.

Així doncs, les instruccions relatives a les mesures excepcionals que es van haver d'adoptar per la manca de disponibilitat d'aquesta vacuna (HA) en el document *Guia de priorització per a l'ús de determinades vacunes davant la manca de disponibilitat* queden sense efecte a partir del dia 19 de juny de 2017.

Per tant, cal administrar la vacuna contra l'HA (amb una única dosi, a excepció del cas de persones amb immunodepressió) a:

- Persones amb conductes sexuals de risc: homes que tenen relacions sexuals amb altres homes o amb múltiples parelles i professionals del sexe.
- Persones amb hepatopatia crònica.
- Persones que han rebut o que estan pendents de rebre un trasplantament hepàtic.
- Usuaris de drogues per via parenteral.
- Persones amb risc ocupacional.
- Viatgers a zones d'alta o moderada endemicitat d'hepatitis A.

Per verificar la susceptibilitat, i sempre que sigui possible, és necessari comprovar a la història clínica els antecedents de malalties, vacunacions o proves serològiques prèvies i, en cas necessari, cal realitzar proves serològiques, especialment a les persones que tinguin entre 30 i 70 anys, donada la limitada disponibilitat de vacunes.

Cal tenir en compte que els nascuts a Catalunya abans de l'any 1960 són majoritàriament immunes per infecció natural, que la majoria de les persones amb una edat compresa entre els 11 i els 30 anys estan vacunades (any 1998: inici del programa pilot de vacunació contra les hepatitis A i B als 11-12 anys), i que des del 2014 s'administra aquesta vacuna sistemàticament als infants d'1 i 6 anys.

Pel que fa a la resta de vacunes afectades (la vacuna contra l'hepatitis B i combinacions) s'està treballant per poder disposar de dosis, però, de moment, i fins que no es tinguin les dosis necessàries, es mantenen les indicacions d'ús restringit en grups de risc. No hi ha problemes de disponibilitat per a la resta de vacunes.