

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DISPONIBILITAT DE LA VACUNA COMBINADA CONTRA EL XARAMPIÓ, LA RUBÈOLA, LA PAROTIDITIS I LA VARICEL·LA

Març de 2024

El calendari de vacunacions sistemàtiques vigent a Catalunya és el que regula el Decret 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques. Aquest decret ha estat modificat per diferents ordres, amb canvis en les recomanacions d'algunes de les vacunes incloses en el calendari. La darrera modificació s'ha efectuat mitjançant l'Ordre SLT/167/2023, de 21 de juny.

En el calendari de vacunacions s'hi inclouen les següents recomanacions de vacunació contra el xarampió, la rubèola, la parotiditis i la varicel·la:

- 12 mesos: primera dosi de xarampió, rubèola, parotiditis (XRP)
- 15 mesos: primera dosi de varicel·la (V)
- **3 anys: segona dosi de xarampió, rubèola, parotiditis (XRP) i varicel·la (V)**

A partir de finals del mes de març estarà disponible als centres de vacunació un producte que inclou els quatre antigens que fins ara s'han administrat separatament mitjançant dues vacunes als infants als 3 anys d'edat. L'objectiu principal d'aquest canvi és **millorar les cobertures de vacunació** de totes dues vacunes en les segones dosis, així com **reduir el nombre de punxades als infants** als 3 anys.

El producte disponible per a aquest any 2024 és Proquad®, del laboratori Merck, Sharp & Dohme, i té les recomanacions d'ús següents:

- Indicada a partir dels 12 mesos d'edat. Tot i això, tenint en compte el calendari de vacunacions, **les dosis disponibles són per a l'administració de la segona dosi de XRP i V als 3 anys.**
- Cal reconstituir-lo abans d'administrar-lo.
- Cal respectar-ne les recomanacions d'ús, així com els intervals especificats a la fitxa tècnica (amb altres vacunes i/o altres productes).
- Es pot administrar per via subcutània o intramuscular.
- Vacuna atenuada: és important respectar les contraindicacions i recomanacions.
- Reaccions adverses més freqüents: pot provocar febre, dolor, inflamació o enrogiment local, erupció (de tipus xarampió o varicel·la o en el lloc de la inoculació), irritabilitat, infecció del tracte respiratori superior, vòmits i diarrea.

Per a més informació, podeu consultar la [fitxa tècnica](#) del producte.

Annex: Composició de la vacuna

ProQuad® (Merck, Sharp & Dohme) 0,5 ml

Composició antigènica	Adjuvant	Altres components
Virus del xarampió, soca Enders' Edmonston (virus, atenuats): $\geq 3,00 \log_{10}$ TCID₅₀* Virus de la parotiditis, soca Jeryl Lynn [Nivell B] (virus, atenuats): $\geq 4,30 \log_{10}$ TCID₅₀* Virus de la rubèola, soca Wistar RA 27/3 (virus, atenuats): $\geq 3,00 \log_{10}$ TCID₅₀* Virus de la varicel·la, soca Oka/Merck (virus, atenuats): $\geq 3,99 \log_{10}$ UFP**		Sacarosa Gelatina hidrolitzada Clorur sòdic Sorbitol: 16 mg Glutamat monosòdic Fosfat sòdic Bicarbonat sòdic Fosfat potàssic Clorur de potassi Medi 199 amb sals de Hanks Medi de cultiu essencial mínim d'Eagle Neomicina Vermell de fenol Àcid clorhídric Hidròxid de sodi Urea Aigua per a injectables

*Dosis que infecta al 50% dels histocultius

**Unitats formadores de placa