Benvolgudes famílies i tutors legals,

Com cada any, i coincidint amb l'inici del curs escolar, el Departament de Salut, a través dels equips d'atenció primària, administrarà les vacunes a l'alumnat en els centres educatius, segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya. La vacunació és la millor eina disponible per prevenir i controlar les malalties incloses en aquest calendari.

L'objectiu de la vacunació al centre escolar és facilitar-hi l'accés a tot l'alumnat i continuar amb el calendari de vacunacions que s'inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacunin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables. Per aquest motiu, la vostra col·laboració és molt important.

En aquest curs escolar 2026-2027, s'administraran les vacunes següents:

- **Vacuna contra el virus del papil·loma humà (vacuna VPH)**: una única dosi (infants).

  El virus del papil·loma humà (VPH) és un virus molt freqüent que es transmet principalment a través de les relacions sexuals. Pot afectar tant homes com dones i, en alguns casos, causar càncer de coll uterí i altres tipus de càncer, així com berrugues genitals. La majoria de les persones entraran en contacte amb aquest virus al llarg de la seva vida. Per això, és important vacunar-se abans d'estar exposat al virus, ja que la vacuna ofereix la màxima protecció quan s'administra abans del primer contacte. La vacunació és una mesura segura i eficaç que ajuda a prevenir les infeccions pels tipus de VPH responsables de la majoria d'aquests càncers i de les berrugues genitals.

- **Vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina (dTpa)**: una única dosi de record.

  La tos ferina és una infecció respiratòria aguda bacteriana molt contagiosa. Actualment, el calendari de vacunacions sistemàtiques inclou la recomanació d'una dosi als 11-12 anys (sisè de primària) de la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular de càrrega antigènica reduïda (dTpa).

- **Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY)**, en una única dosi si l'infant no l'ha rebut després dels 10 anys, i independentment de les dosis administrades de la vacuna contra el meningococ C conjugada (vacuna MC).

- **Vacuna contra l'hepatitis A (vacuna HA)**, en una única dosi en el cas que l'infant estigui vacunat amb una dosi anterior (la pauta completa són dues dosis). Als infants que no hagin rebut cap dosi de la vacuna anteriorment o no hagin passat la malaltia, se'ls han d'administrar dues dosis: la primera al centre educatiu i la segona, al CAP.

- **Vacuna contra la varicel·la (vacuna V)**, en una única dosi en el cas que l'infant estigui vacunat amb una dosi anterior (la pauta completa són dues dosis). Als infants que no hagin

rebut cap dosi de la vacuna anteriorment o no hagin passat la malaltia, se'ls han d'administrar dues dosis: la primera al centre educatiu i la segona, al CAP.

En general, totes aquestes vacunes es toleren bé, malgrat que poden causar molèsties locals (inflamació i envermelliment en el lloc de la punció) o malestar general (febre, desmais o mal de cap). Pràcticament mai no produeixen efectes adversos greus.

Com en la resta de vacunes, en cas de malaltia febril aguda, es recomana posposar la vacunació fins que s'hagi resolt el quadre clínic.

Cal recordar que després de l'administració de vacunes es pot fer activitat normal, tot i que s'aconsella evitar la pràctica d'exercici físic intens durant les quatre hores posteriors.

Us demanem que empleneu el formulari adjunt amb la indicació de si autoritzeu o no la vacunació de l'infant del qual sou responsables, i que el lliureu al tutor o tutora de la classe, ja que necessitem la vostra autorització per poder administrar les vacunes en el centre educatiu.

Properament us informarem del dia de la vacunació. És imprescindible que aquest dia l'infant porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades, revisar la informació que hi consta i poder, si cal, administrar-li les vacunes necessàries.

En cas de detectar que li manca alguna altra vacuna, se us farà arribar un imprès per tal que pugueu adreçar-vos al vostre centre sanitari de referència per actualitzar el seu estat vacunal.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de vacunes al Canal Salut del Departament de Salut (https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/) o trucar al telèfon 061 Salut Respon.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Cordialment,

Equip de Salut Escolar (ESE) i Equip d'Atenció Primària (EAP)

Setembre de 2026

Dragi părinți și tutori legali,

Ca la fiecare început de an școlar, echipele de asistență primară ale Ministerului Sănătății vor efectua vaccinarea elevilor în școli, conform calendarului de vaccinare în vigoare în Catalonia. Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire și control a bolilor incluse în acest program.

Scopul vaccinării în unitatea de învățământ este de a facilita accesul tuturor elevilor la vaccinare și de a continua calendarul de vaccinare început în copilărie. Vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane ajută la controlul transmiterii bolilor și la protejarea celor mai vulnerabili. Din acest motiv, colaborarea dumneavoastră este esențială.

În anul școlar 2025-2026, se vor administra următoarele vaccinuri:

- **Vaccinul împotriva virusului papiloma uman (vaccin HPV):** o singură doză (pentru toți copiii).

  Virusul papiloma uman (HPV) este un virus foarte frecvent, transmis în principal prin contact sexual. Acesta afectează atât bărbații, cât și femeile, iar în unele cazuri poate provoca cancer de col uterin, alte forme de cancer sau negi genitali (veruci). Majoritatea persoanelor vor intra în contact cu acest virus pe parcursul vieții. De aceea, este important ca vaccinarea să fie efectuată înainte de expunerea la virus: vaccinul oferă protecție maximă dacă este administrat înainte de primul contact cu acesta. Vaccinarea este o măsură sigură și eficientă care ajută la prevenirea infecțiilor cu tulpinile de HPV responsabile de majoritatea acestor forme de cancer și de apariția verucilor genitale.

- **Vaccinul diftero-tetano-pertussis acelular (dTpa):** o singură doză de rapel.

  Tusea convulsivă (pertussis) este o infecție respiratorie acută de origine bacteriană, extrem de contagioasă. În prezent, calendarul de vaccinare prevede administrarea unei doze de rapel a vaccinului difteric, tetanic și pertussis acelular cu conținut redus de antigene (dTpa) la vârsta de 11–12 ani (clasa a VI-a).

- **Vaccinul meningococic conjugat tetravalent (vaccinul MenACWY):** o singură doză dacă copilul nu l-a primit după vârsta de 10 ani, indiferent de dozele administrate anterior de vaccin meningococic conjugat împotriva serogrupului C (vaccinul MenC).

- **Vaccinul împotriva hepatitei A (vaccinul HA):** o singură doză în cazul în care copilul a fost vaccinat anterior cu o doză (schema completă de vaccinare cuprinde două doze). Copiilor care nu au primit încă nicio doză sau nu au trecut prin boală li se vor administra două doze: prima, în școală, iar a doua, la centrul de asistență primară (CAP).

- **Vaccinul împotriva varicelei (vaccinul V):** o singură doză în cazul în care copilul a fost vaccinat anterior cu o doză (schema completă de vaccinare cuprinde două doze). Copiilor

care nu au primit încă nicio doză sau nu au trecut prin boală li se vor administra două doze: prima, în școală, iar a doua, la centrul de asistență primară (CAP).

În general, toate aceste vaccinuri sunt bine tolerate, deși pot provoca disconfort local (inflamație și roșeață la locul injectării) sau stare generală de rău (febră, leșin, dureri de cap). Reacțiile adverse severe sunt extrem de rare.

Ca în cazul oricărui vaccin, dacă copilul prezintă o boală acută cu febră, vaccinarea trebuie amânată până la vindecarea completă.

Este important de reținut că, după administrarea vaccinurilor, copilul își poate continua activitățile obișnuite, deși se recomandă evitarea efortului fizic intens în primele patru ore.

Vă rugăm să completați formularul anexat, precizând dacă sunteți sau nu de acord cu vaccinarea copilului aflat în grija dumneavoastră și să îl înmânați învățătorului sau dirigintelui clasei. Acordul dumneavoastră este necesar pentru administrarea vaccinurilor în unitatea de învățământ.

Vă vom informa în curând cu privire la data vaccinării. Este esențial ca, în ziua vaccinării, copilul să aducă carnetul de sănătate sau carnetul de vaccinări. Astfel, personalul medical va putea înregistra dozele administrate, verifica informațiile existente și, dacă este necesar, administra vaccinurile corespunzătoare.

În cazul în care se constată că fiicei sau fiului dumneavoastră îi lipsește un alt vaccin, veți primi un formular prin care veți fi îndrumat(ă) să vă adresați centrului medical de referință, în vederea actualizării situației vaccinărilor.

Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul dedicat vaccinurilor, disponibil pe Canal Salut (https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/) sau puteți apela numărul 061 – Salut Respon.

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare.

Cu stimă,

Echipa de Sănătate Școlară (ESE) și Echipa de Asistență Medicală Primară (EAP)

Septembrie 2026